

0136.04.0562

**"The Fundamentals of Development", an Informative Report Issued by  
the Ramallah Health Department, 1991**

Found in the Birzeit Women's Charitable Society Collection, this printed informative report in Arabic provides details about the fundamentals of development. The report was published by the Ramallah Health Department under the Public Health Division in 1991.

[illegible]

١ - ننظر الى الكفاءة والكيفية لفعل ذلك المتطوع ( مثل الجلوس ، الحيو ، .. إلخ )  
مثال جلوس الطفل ..

- .../5



الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة  
إدارة الصحة العامة / مديرية صحة لواء رام الله

تطور الطفل الطبيعي

الجنين : - عندما يكتمل الجنين ٢٨ أسبوع يستطيع القيام بعدة أشياء ويتأثر بالبيئة الخارجية مثل الحالة النفسية للأم والأوضاع الجسدية للأم الجوع لأم ، مثل ذلك الموسيقى ، الضوء ، تعليمه على الحروف معينة أو قراءة معلومات بصوت عالي فنلاحظ ان الجنين تكتم لديه جميع الحواس فيستطيع ان يري ويسمع ويتحرك ويتأثر بجميع الظروف المحيطة في الأم ويكون وضع الجنين في داخل الرحم في بداية الحمل وحتى نهاية الشهر السابع بانفساء اليدين والقدمين واعتادهم عن بعض وما يلبث ان يتحول بعد ذلك الى وضع الانقباض في المراحل واقتراهاها مع بعضها البعض ونلاحظ هذا الوضع بعد الولادة مباشرة ويستمر ذلك حتى نهاية الشهر الأول .

- ١ - وضع المولود حين استلقائه على بطنه
- يكون اتجاه رأس المولود الى احد الجانب ( الجسم / يمين او شمال ) وهو الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله \*
- الايدي منقبضة نحو الصدر والايها الى الداخل واليد منقبضة وقريبة من الجسم \*
- ٢ - وضع المولود حين استلقائه على ظهره
- الرأس الى احد الجانب مع الحركة \*
- الايدي والرجل بعيدة عن الجسم او المخط الأوسط للجسم \*
- وعناق وضمان يكون الرأس في الوسط وهو هند بكاء الطفل وخلال المرضعة \*
- ٣ - عند سحب الطفل من اليدين لوضع الجلوس نلاحظ ان رأس الطفل يكون مدنوع الى الخلف بحد الجاذبية ثم يندفع قليلا الى الامام \*

الانعكاسات المولودة مع الطفل

- ١ - الانعكاسات الزنبركية : عند محاولة سحب يد او قدم المولود بعيد عن جسمه ثم تركها نجد انها تعود الى وضعها الاصلي \*
  - ٢ - انعكاسات الانقباض Grasp Reflex ( أ ) اي حافظ لبطن اليد بواسطة الاصبع او قلم نجد ان الطفل يقبض يده على ذلك الشيء وافوى ما تكون خلال الشهرين و ٣ اشهر الاولى وبعد ذلك يجب ان تختفي فترى ان اليد ٨٠% من الوقت يجب ان تبقى مفتوحة \*
  - ب ) القدين اي حافظ او لمس لبطن القدم نلاحظ ان اصابع الطفل تتجه الى اسفل ، يجب ان تختفي ردة الفعل هذه بعد ان يبدأ الطفل بالمشي \*
  - ٣ - انعكاس الخوف Moro R. عندما ترفع الطفل قليلا عن السرير ثم تحاول تركه في الهواء لبرهة نجد ان الايدي تندفع الى الخارج الجسم ثم تعود مرة اخرى الى الداخل \*
  - ٤ - انعكاس انقباض الرقبة المتشابه
- عند وضع الطفل على ظهره يتجه رأسه الى الجانبين مثلاً الى اليمين نجد ان اليد اليمنى والرجل اليسرى تكون منقبضة والرجل اليمنى بالإضافة الى الرجل اليسرى التي يتجه اليها الرأس تكون في حالة انبساط \*
- وتختفي هذه الانعكاسات في الشهر الرابع \*



## الإدارة المدنية لمنطقة يهودا والسامرة

إدارة الصحة العامة / مديرية صحة لواء رام الله

### انعكاسات ابتدائية

- ١ - Primary Placing عندما تحمل طفل بين كتفيه وتضع قدمه على حافة طاولة تجد أن الطفل يرفع قدمه على حافة طاولة إلى أعلى الطاولة في محاولة منه لاختذ بوضع على الطاولة \*
- ٢ - البشوف الابتدائي : عندما تحمل الطفل من قدميه وتحاول توقيفه على سطح طاولة وذلك بأن يلمس سطح الطاولة بلمن قدمه فتجد أن الطفل يحاول البشوف بأن يمد قدمه مستقيمة \*
- ٣ - المشي الابتدائي : عندما تحمل الطفل بين كتفيه وتحاول دفعه للأمام بأنه يحاول المشي بأن يمد قدم بعد أخرى \*

هذه الانعكاسات هامة جداً في بداية الشهر الأول وحتى منتصف الشهر الثاني ويجب أن يمد الشهر الثاني \*

الطبيعي

### انعكاسات فعل الفم :

- ١ - Rooting عند لمس حواف فم الطفل تجد أنه يدير وجهه نحو الجهة التي يتلقى فيها الإحساس ، ولطبعي أن تختفي في الشهر الرابع \*
- ٢ - Gag R. أي حافز أو ملامسة للحلق الأمامي لفم الطفل يبطي الطفل انعكاس كأنه يريد أن يستفراغ وكلما زاد عمر الطفل تراجع هذه الانعكاس إلى الخلف ، وذلك عند استعمال المعلقة أو وضع الطفل يده أو المصاصة في فمه \*
- ٣ - الرضاعة والبلع : إن لكل طفل طريقة خاصة بالرضاعة بعضهم يرضع أو يمشح حليب من صدر أمه ثلاث مرات ثم يبلع وبعضهم يرضع ١٠ مرتين ثم يبلع وهذا هو الوضع الطبيعي \*
- وفي نهاية الشهر الثاني وأوائل الشهر الثالث يصبح غذاء الانعكاس إراديًا \*
- ٤ - انعكاس البص : عند وضع أصبعك داخل فم الطفل فوق اللثة يجب أن يعض الطفل عليه مرتين أو ثلاث مرات وهذا هو الطبيعي \*

فإن وضعت أصبعك وعض الطفل عضه وأجداً فقط فهذا يعني أن الطفل يعاني من انقباض في عضلاته وإن لم يعض إطلاقاً فهذا معناه أن الطفل يعاني من رخاوة في عضلات جسمه \*

مديرية صحة لواء رام الله